



## BRODIFACOU 27 PPM

**Nom homologué :** BRODITEC CX-27F  
**Type de produit :** TP 14-Rodenticide  
**Formulation :** Mélange de 3 céréales : flocons d'avoine, graines de tournesol et maïs concassés  
**N° A.M.M.:** FR-2023-0010  
**Composition :** 0,0027% m/m de Brodifacoum tech. (n° CAS 56073-10-0)



Contre	SUPPORT	RÉFÉRENCE	GENCODE	Conditionnement	Groupage	Palette
Rats-souris-campagnols	Mélange de céréales	TFAFR046	8 005831 100846	seau 5kg	Unitaire	96 seaux

### USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

BRODITEC CX-27F est notre appât rodenticide de dernière génération caractérisé par un mélange de céréales, conditionné en vrac, pour le contrôle des souris domestiques, campagnols des champs, rats bruns et rats noirs, à tous les stades de développement. BRODITEC CX-27F est à base de brodifacoum, puissante substance active anticoagulante de deuxième génération à prise unique, permettant le contrôle complet des populations de rongeurs et brisant toutes les résistances connues. Le mode d'action de la substance active permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs de la colonie vis-à-vis de l'appât.

BRODITEC CX-27F est un mélange bien équilibré de 5 éléments spécifiquement étudiés pour attirer les espèces de rongeurs susvisées : maïs concassé, flocons d'avoine, grains entiers de tournesol, sucre et la technologie FLUO-NP® - un adjuvant spécial qui rend l'appât facilement identifiable même dans de mauvaises conditions d'éclairage et qui peut aussi détecter les fèces des rongeurs clairement visibles sous la lumière UV. En faisant briller une lampe UV portable (lumière noire) sur les excréments de rongeurs, il est facile d'identifier et de suivre les mouvements des rongeurs. Si utilisé comme appât périmétrique, il permet de déterminer de façon plus précise si les rongeurs sont en train d'accéder à l'intérieur d'un bâtiment et, en cas affirmatif, où se trouvent les points d'accès.

FLUO-NP® aussi à mettre en évidence la présence de rongeurs dans les faux plafonds, les sous-planchers, les espaces vides des murs et dans d'autres zones sombres et difficile accès où les fèces ne sont pas normalement visibles. L'ajout du FLUO-NP® permet également de confirmer la sécurité du positionnement des appâts. Cet appât est idéal pour les traitements des rats noirs et campagnols des champs et dans toutes les situations où le régime alimentaire des rongeurs est principalement basé sur la consommation de graines de maïs, comme dans les bâtiments ruraux et zootechniques, les greniers, les porcheries et dans certains types de bâtiments civils et industriels (fabrication d'aliments pour les animaux, traitement de la farine, moulins, etc.). BRODITEC CX-27F contient un agent amérissant (*Benzoate de dénatonium*) pour aider à prévenir la consommation par l'homme.



#### INSTRUCTIONS D'EMPLOI

**Catégorie d'utilisateurs :** Professionnels

**Méthode d'application :** Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés, dans des points d'appâts couverts et protégés ou application directe dans les terriers.

**Dose et fréquence d'application :**

Contre les souris domestiques (*Mus Musculus*) et les campagnols des champs (*Microtus arvalis*) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur - autour des bâtiments et zones ouvertes :

- 45-50 grammes d'appât par point d'appât tous les 2-5 mètres.

Contre les rats (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur - autour des bâtiments et zones ouvertes :

- 90-100 grammes d'appât par point d'appât tous les 5-10 mètres.

Contre le rat brun (*Rattus norvegicus*) - Utilisation à l'extérieur en

décharges et déchetteries :

- 90-100 grammes d'appât par point d'appât tous les 5-10 mètres. Les postes d'appâtage doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris et les campagnols des champs) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Rechargez le poste d'appâtage au besoin. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

**Pour l'utilisation à l'extérieur - autour des bâtiments, zones ouvertes, décharges et déchetteries :** Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition aux espèces non cibles.

**Pour l'application directe dans les terriers :** Les appâts doivent être placés de manière à minimiser l'exposition des espèces non cibles et des enfants. Couvrir ou bloquer les entrées du terrier où est placé l'appât afin de réduire le risque que l'appât soit ressorti ou dispersé.

#### INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS ET MESURES D'URGENCE POUR PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.

**Antidote :** Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin.

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Si des symptômes apparaissent, rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Appeler un centre antipoison/un médecin.

- EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. En cas de symptômes : appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale. En l'absence de symptômes: appeler un centre antipoison/un médecin. Informations au personnel de santé / au médecin : initié les mesures de premiers secours si nécessaire, puis appeler un centre antipoison. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.

- EN CAS D'INHALATION : si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin.

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes : « Ne pas déplacer ni ouvrir ; contient un rodenticide ; BRODITEC CX-27F, N° AMM : FR-2023-0010 ; substance active : Brodifacoum ; en cas d'incident, contacter un centre antipoison. N° ORFILA (INRS) 01 45 42 59 59 ».

Dangereux pour la faune.

Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

**En cas d'incident, contacter un centre antipoison. N° ORFILA (INRS): 01 45 42 59 59**

**INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE :** une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de

collecte approprié. Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.

**CONDITIONS DE STOCKAGE :** conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage. Stocker le produit à une température inférieure à 35 °C. Stocker le produit à l'abri de la lumière. Ne pas stocker à proximité des denrées alimentaires et boissons destinées à la consommation humaine et animale.

**Durée de stockage :** 2 ans à compter de sa date de fabrication.

**AUTRES INFORMATIONS :** en raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer. Ce produit contient un agent amérissant et un colorant.

Classification : ATTENTION



**UFI: 7630-P012-M00S-4Y95**

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

P260 Ne pas respirer les poussières.

P314 Consulter un médecin en cas de malaise.

P501 Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation en vigueur.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TP 14. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Respectez les précautions d'emploi.